



Animal Health de México, S. de R.L. de C.V.

Avenida tecnológico Sur 134-4

Unidad habitacional Moderna, Querétaro, 76030

Email: mexico@ecoanimalhealth.com

www.ecoanimalhealth.com

AIVLOSIN[®]

FG 50

ANTIBIÓTICO MACRÓLIDO DE TERCERA GENERACIÓN.

Número de registro: Q-1076-016

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

USO SOLAMENTE EN ANIMALES.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

1. Fórmula.

Tilvalosina (como tartrato de tilvalosina) 4.25% p/p, **excipiente** c.b.p.
100% p/p.

2. Presentaciones.

Sacos de 5, 10, 15, 20 y 25 Kg

3. Descripción de la forma farmacéutica y vía de administración.

Polvo granular beige. Oral, mezclado en el aliento.

4. Condiciones de almacenamiento.

Almacenar alejado de la luz solar en un lugar seco a temperaturas inferiores a 30 °C.

4. Vida útil.

2 años.

5. Dosificación.

Aves: 12,75 miligramos de tilvalosina / kg de peso corporal / día, durante 7 días para tratamiento de enfermedad respiratoria crónica asociada con *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae*. La cantidad de AIVLOSIN FG50 necesaria por tonelada de alimento es de 3kg por tonelada de alimento*.

*Importante: estas tasas de inclusión suponen que un pollo come el equivalente al 10% de su peso corporal por día; pero, con base en el consumo promedio diario de alimento de los animales a medicar en cada granja, el veterinario puede ajustar la inclusión de AIVLOSIN FG50 por tonelada de alimento.



Animal Health de México, S. de R.L. de C.V.

Avenida tecnológico Sur 134-4

Unidad habitacional Moderna, Querétaro, 76030

Email: mexico@ecoanimalhealth.com

www.ecoanimalhealth.com

Cerdos: 2,125 miligramos de tilvalosina / kg de peso corporal / día, durante 7 días para el tratamiento de Neumonía enzoótica porcina asociada con *Mycoplasma hyopneumoniae*. La cantidad de AIVLOSIN FG50 necesaria por tonelada de alimento es de 1Kg por tonelada de alimento*

2,125 miligramos de tilvalosina / kg de peso corporal / día, durante 14 días para el tratamiento de Ielitis (EPP) asociada con *Lawsonia intracellularis*. La cantidad de AIVLOSIN FG50 necesaria por tonelada de alimento es de 1Kg por tonelada de alimento*

4,25 miligramos de tilvalosina / kg de peso corporal / día, durante 10 días para el tratamiento de Disentería porcina asociada con *Brachyspira hyodysenteriae*. La cantidad de AIVLOSIN FG50 necesaria por tonelada de alimento es de 2kg por tonelada de alimento*

*Importante: estas tasas de inclusión suponen que un cerdo come el equivalente al 5% de su peso corporal por día (en la fase de crecimiento entre los 15 a los 60 kg); pero, con base en el consumo promedio diario de alimento de los animales a medicar en cada granja, el veterinario puede ajustar la inclusión de AIVLOSIN FG50 por tonelada de alimento.

Cuando es usado en alimento peletizado y pre acondicionado con vapor, por hasta 5 minutos y, a 70°C, AIVLOSIN FG50 permanecerá estable hasta por 1 mes. Es esencial lograr una mezcla homogénea.

6. Indicaciones.

En aves (*Gallus domesticus*: postura comercial, reproductoras, pollo engorda): para el tratamiento de, Enfermedad Respiratoria Crónica asociada con *Mycoplasma gallisepticum*.

Además, en pruebas de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), la tilvalosina de AIVLOSIN FG50 demostró alta actividad contra *Mycoplasma synoviae* (sinovitis infecciosa), *Mycoplasma meleagridis*, *Clostridium perfringens*, *Ornithobacterium rhinotracheale*.

En cerdos para el tratamiento de:

1) Neumonía Enzoótica Porcina causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*, 2) Ielitis (Enteropatía Proliferativa Porcina) causada por *Lawsonia intracellularis*, 3) Disentería Porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*.

Registered No: 2665200

All and any business undertaken by the Company is transacted upon the terms of the Company's Trading Conditions, a copy of which may be obtained free of charge from the above address.



Animal Health de México, S. de R.L. de C.V.

Avenida tecnológico Sur 134-4

Unidad habitacional Moderna, Querétaro, 76030

Email: mexico@ecoanimalhealth.com

www.ecoanimalhealth.com

Además, en pruebas de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), la tilvalosina de AIVLOSIN FG50 demostró alta actividad contra: *Mycoplasma hyorhinis*, *Mycoplasma hyosynoviae*, y *Brachyspira pilosicoli* (Colitis porcina).

7. Periodo de retiro

Gallinas:

Postura Comercial y Reproductoras: 0 días

Pollos de engorda: 0 días

Porcinos: 0 días

8. Precauciones

Manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Exhaustivas pruebas científicas, certificadas, avalan que la tilvalosina de ECO ANIMAL HEALTH es muy segura: para usarse en animales, para ser manejada por humanos, y para el ambiente.

ELABORADO PARA:

Eco Animal Health LTD

The Grange, 100 High Street, London N14 6BN

Tel: +44 208 447 8899

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Eco Animal Health de México, S. de R.L. de C.V.

Avenida Tecnológico Sur 134-4,

Unidad Habitacional Moderna, Querétaro, Qro. C.P. 76030

Tel.: (045) 44 24 26 05 16

E-mail: mexico@ecoanimalhealth.com

Registered No: 2665200

All and any business undertaken by the Company is transacted upon the terms of the Company's Trading Conditions, a copy of which may be obtained free of charge from the above address.